

የእድሜ ማራዘሚያ መድሐኒት (Antiretroviral Treatment) በብርካር ኅንፋልቭስ

በህክምና ታረክ ውስጥ ተጠቃሽ ከሆኑት ግኝቶች ውስጥ አንዱ የእድሜ ማራዘሚያ ወይም አንቲሪቮራል ቲራፒ (antiretroviral therapy) ህክምና ነው። ይህ የህክምና ዘዴ ለHIV/AIDS ዋና ማስታገሻ መሆኑ የታወቀ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ግን ፈውስ እንዳልሆነ ተረጋግጧል።

ህክምናው የተለያዩ አይነቶች አሉት። እነዚህ አይነቶች የሚወሰኑት ቫይረሱ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በመገንዘብ ነው። አይነቶቹ በአራት ሊክራሎ ይኝላሉ። እነሱም ኒውክሊዮሳይድ/ኒውክሊዮታይድ ረቨርስ ትራንስክሪፕቲቱዝ ኢንሂቢተርስ (Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors) ነንኒውክሊዮሳይድ ረቨርስ ትራንስክሪፕቲቱዝ ኢንሂቢተርስ (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) ፕሮቲዬዝ ኢንሂቢተርስ (Protease Inhibitors) እና ፊውዥን ወይም ኤንትሪ ኢንሂቢተርስ (Fusion or Entry Inhibitors) በመባል ይታወቃሉ። ኒውክሊዮሳይድ የተባለው አይነት በመጀመሪያ የተፈበረከው ሲሆን የተሰራውም እ.አ.አ. በ80ዎቹ መጨረሻ ላይ ነው። ግን ይህ መድሐኒት ጠቃሚነቱ የታየው እ.አ.አ. በ90ዎቹ መሀል ላይ እንደሆነ ታወቋል። ይህም ሲሆን የቻለው ህዚሞች ይህን መድሃኒት ከሌሎች ጋር ደርበው በማዘዛቸው ነው። ይህ የመድሐኒቶች ቅልቅል ኮክቱል ተብሎ የተሰየመ ሲሆን ጠቃሚነቱም የጎላው ቫይረሱ አራሱን እንደሚቀደርና አንድ መድሃኒት ለብቻው ሊከላከለው ባለመቻሉ ነው። በአሁኑ ጊዜ ከሃያ በላይ መድሃኒቶች ገበያ ላይ ሲኖሩ ከአንድ ቫይረስ ተከላካይ ንጥረነገር ብቻ እና ከብዙ ንጥረነገሮች የተሰሩ ይገኙበታል።

በእድሜ ማራዘሚያ መድሐኒት ለመታከም ሲታሰብ የተለያዩ ምርመራዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የቫይረሱን ስርጭት (viral load) እና ሲዲ ፎር ካውንት (CD4+ count) መታወቅ ይኖርበታል። እነዚህ ምርመራዎች የእድሜ ማራዘሚያ መድሐኒቱ ወዲያውኑ ወይም ዘጊዜያዊ መጀመር እንዳለበት ይጠቁማሉ። ከቫይረሱ ስርጭትና ከመድሐኒቱ ጋር የሚመጡ ተግጓዳኝ ህመሞች መሐል የትኛው ለበሽተኛው አደገኛ እንደሆነ መገንዘብም ያስፈልጋል። ብዙውን ጊዜ የሚታሰበው ማንኛውም የHIV ቫይረስ ተሸካሚ ወዲያውኑ መድሐኒቱን መጠቀም እንዳለበት ነው። ነገርግን ይህ ትክክል አይደለም። አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ለዛ በሽተኛ መድሐኒቱ በእርግጥ ጠቃሚ እንደሆነ መረጋገጥ አለበት። ሌላው የተሳሳተ አስተሳሰብ ደግሞ መድሐኒቱን የሚጠቀሙ ሰዎች ለሞት የተቃረኑ ብቻ ናቸው የሚለው ነው። ይህ እውነት አይደለም ምክንያቱም በሙሉ ጤና ያሉ የቫይረሱ ተሸካሚዎች መድሐኒቱን መውሰድ ስለሚችሉ ነው። አንዳንድ የቫይረሱ ተጠቂዎች ደግሞ ይህ የእድሜ ማራዘሚያ መድሐኒትን መውሰድ ከጀመሩ የሰራ ገበታቸውን መልቀቅ እንዳለባቸውና በየጊዜው ወደ ሆስፒታል መመላለስ እንደሚኖርባቸው ያስባሉ። ይህ የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው ምክንያቱም መድሐኒቱ በክንኒ መልክ ስለሚሰጥ ታካሚው እንደ ማንኛውም ሰው መስራትና መኖር ይችላል።

መቼ ነው ከአንድ መድሐኒት ወደሌላ መለወጥ ያለበት? መድሐኒቱን ከሚጠቀሙ ታካሚዎች መሃል ግማሽ ያህሉ መድሐኒቱን በጀመሩ በአንድ አመት ውስጥ ለውጥ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ለዚህም 3 የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። እነዚህም የበሽታዎች መከሰት (የተቆጣጥ በሽታ፤ የደም ማነስና የሃሞት ቀረጫት) መድሐኒቱ መስራት ማቆም እና ከጊዜ በኋላ የሚከሰት የጤና መታወክ ይገኙበታል።

ምንም እንኳን የእድሜ ማራዘሚያ መድሐኒቶች (antiretroviral drugs (ART)) ለብዙ የቫይረሱ ተጠቂዎች ተስፋም ቢሰጡ ዋጋቸው ለታዳጊ ሀገሮች በጣም ከፍተኛ ነው። UNAIDS የተባለ ድርጅት እንዳስታወቀው ከሆነ እ.አ.አ. በ2006 39.5 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ

ተጠቅቷዋል እና ከነዚህም ውስጥ አብዛኛዎቹ በታዳጊ ሃገራት የሚኖሩ ናቸው። በነዚህ ሀገራት ከሚኖሩት ተጠቂዎች በጣም ጥቂቶቹ ናቸው የአድጫ ማራዘሚያ መድሃኒቶችን መጠቀም የሚችሉት። ሞትን ለመከላከል እነዚህ መድሃኒቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው። የመድሃኒቶቹ እጥረት የሻይረሱን ተሸካሚዎችን ህይወት በእጅጉ ያሳጥራል።