

# WORKING TO EMPOWER

ወርኪን ቱ ኢምፖወር

Presented by Logan Cochrane

Translated by Binyam Y. Tekle

## መግቢያ

ጥያቄ :- ኤችአይቪ ምንድርነው? ሃዩመን ኢሚዩኖ-ደፊሽንሲ ቫይረስ

ጥያቄ :- ኤይድስ ምንድርነው? አኳይርድ ኢሚዩን ደፊሽንሲ ሲንድረም

ሁለቱም ፡ እርስ በራሳቸው አንዱ የሌለው ጠንቅ የመሆን ባሕርይ አላቸው። ኤችአይቪ ፡ ሰውነታችንን የሚያጠቃ ቫይረስ ነው። ኤይድስ ፡ የአንድ ሰው ራሱን የመከላከል ተፈጥሮአዊ ዓቅም በቫይረስ በተዳከመበት ወቅት ፡ ይኸንኑ ዕድል በመጠቀም ፡ ወደ ሰውነቱ የሚገቡ በመሆናቸው ፡ በአብዛኛው ጊዜ ፡ “ሁለተኛ ምቹ ጊዜ ጠባቂ በሽታዎች (secondary opportunistic infections)” ተብለው የሚጠሩት ፡ ሁለተኛ በሽታዎች ፡ የሚያስከትሉት ጉዳት ነው። አንድ ሰው ፡ ኤችአይቪ ኖሮት ፡ ኤይድስ ግን ላይኖረው ይችላል ። እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ሲኖር ፡ ሃኪሞች አብዛኛውን ጊዜ ፡ ሰውየው “ኤችአይቪ +” ነው ይላሉ። ሁሉም ኤይድስ ያላቸው ሰዎች ፡ የኤችአይቪ ቫይረስ ተሽካሚዎች ናቸው ። አንድ ፡ በሽታን የመከላከል ተፈጥሮአዊ አቅም (immune system) በጣም ዝቅተኛ ወይም ደካማ የሆነ ሰው ፡ ወይም በሁለተኛ (secondary) ነቀርሳ ወይም በሽታ የተያዘ ቢሆን ፡ ሰውየው ኤይድስ አለው ማለት ነው ። ሰውየው የኤችአይቪ (ኤችአይቪ +) ተሽካሚም ነው።

ኤችአይቪ ፡ የሰውነታችን ከበሽታ የመከላከል ተፈጥሮአዊ ዓቅምን ያጠቃል ። ይህ የሰውነታችን የመከላከል ዓቅም ፡ በሽታዎችን/ነቀርሳዎችን ይዋጋል። ለምሳሌ ፡ አንድ ሰው ፡ በሚታመምበት ወቅት ፡ ጤንነቱ ይመለስ ዘንድ ፡ ሰውነቱ በሽታውን/ነቀርሳውን ለማቆም ይሰራል። አንድ ሰው ፡ ኤችአይቪ ቢኖረው ፡ ቫይረሱ ፡ የሰውነት የመከላከል ዓቅሙን ያጠቃል ። የበሽታን የመከላከል ዓቅሙ እጅግ ተዳክሞ ፡ ሌሎች በሽታዎችንና ነቀርሳዎችን ለማቆም ሳይችል ሲቀር ፡ እነዚህ በሽታዎችና ነቀርሳዎች ፡ ይኸንን አጋጣሚ በመጠቀም ፡ ወደ ሰውነት ሲገቡ ፡ ይኸው ሰው ፡ ኤይድስ አለው ለማለት ይቻላል። ኤይድስ ሕክምናዊ ትርጉምም አለው። ይኸውም ፡ የሲዲ 4 ብዛት (CD4 count) ከ400 በታች በሚሆንበት ጊዜ ነው። አንድ ሰው ፡ በኤይድስ ሳቢያ የሞተ እንደሆነ ፡ በቫይረሱ (ኤችአይቪ) ምክንያት ብቻ አይደለም የሚሞተው። ኤችአይቪ ሰውነቱን ያዳክመውና ፡ ሁለተኛ ምቹ ጊዜ ጠባቂ በሽታዎች የሞቱ ጠንቅ ይሆናሉ። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ፡ ሰውየው ፡ በመሰረቱ ያልታመመም ሊሆን ይችላል ። ይሁንና ፡ ቫይረሱ ፡ የሰውየው በሽታን የመከላከል ዓቅሙ ያዳክመውና ፡ እነዚህ ሁለተኛ ምቹ ጊዜ ጠባቂ በሽታዎች ሞት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከኤይድስ ጋር የሚኖር ሰው ፡ በሽታዎችን/ነቀርሳዎችን በሚገባ ለማቆም ሳይችል ይቀርና ፡ አብዛኛውን ጊዜ ፡ በነዚህ በሽታዎች [እንደ ወጣ ፡ የሳምባ ነቀርሳ (ቲቢ) ወይም በተለምዶ የብርድ በሽታ ተብሎ የሚታወቀው ኒሞንያ (pneumonia) የመሳሰሉት] ምክንያት ይሞታል ። ይህ የሚከሰትበት ምክንያት ፡ ሰውየው ፡ የኤችአይቪ ተሽካሚ በሚሆንበት ወቅት ፡ ሰውነቱ ይዳክምና ፡ ራሱን በሚገባ ለመከላከል አይችልም። አብዛኛውን ጊዜ ፡ ኤችአይቪ እና ሁለተኛ ተጓዳኝ በሽታ/ነቀርሳ በኤይድስ የመሞት ጠንቅ ናቸው።

## ክለሳ

ኤችአይቪ ምንድርነው?

ኤይድስ ምንድርነው?

ኤችአይቪና ኤይድስ እንዴት ይገናኛሉ ወይም ይተሳሰራሉ?

ኤችአይቪ ሰውነታችንን ምን ያደርገዋል?

አንድ ሰው በእንዴት ዓይነት ሁኔታ ነው በኤይድስ የሚሞተው?

## ማስተላለፍ ወይም ማሰራጨት

1) ቫይረሱን በተሽከመውና ቫይረሱን ባልተሽከመው ሰው መካከል ያለመከላከያ ወይም ጥንቃቄ በጉደለው ሁኔታ በሚፈጸም ወሲብ ይህ መከላከያ (ለምሳሌ ኮንዶም) ባለመጠቀም ፡ የሚፈጸም ወሲብ (በፊንጢጣ ፡ በአፍ ፡ በሴት ብልት) ማለት ነው። ኮንዶም ፡ የኤችአይቪን መተላለፍ/ሰርጭት የሚከላከል ፡ ብቸኛ የወሊድ መቆጣጠርያ ዘዴ ነው። ይሁንና ፡ ኮንዶም ወጤታማ የሚሆነው ፡ በአግባቡ ጥቅም ላይ ከዋለ ፡ በሚገባ ከተጠበቀ ወይም ከተያዘና የአገልግሎት ጊዜው ያለለፈ እንደሆነ ብቻ ነው። ያም ሆኖ ፡ ኮንዶም ፡ ሙሉ በሙሉ (100%) ወጤታማ አይደለም ። አንዳንድ ጥናቶች ፡ ኮንዶም 93% ገደማ ወጤታማ መሆኑን ይጠቁማሉ።

ሁለት ሰዎች ያለመከላከያ ወሲብ የፈጸሙ እንደሆነና ፡ አንዳቸውም ቢሆን ቫይረሱን ያልተሽከመ እንደሆነ ፡ በበሽታው የሚያዝ ሰው አይኖርም ። ይህ የጤንነት ሁኔታና የኤችአይቪ ምርመራ ግንዛቤ/ዕውቀት

አስፈላጊነትን ያሳያል። ቫይረሱ ሊተላለፍ የሚችለው ፣ ቫይረሱን ከተሸከመው ሰው ፣ ቫይረሱ ወደ አልተሸከመበት ሰው ብቻ ነው። አንድ ሰው ፣ የወሲብ ጓደኞችን ብዛት በመቀነስ ፣ ከቫይረሱ ጋር ንኪኪ የማድረግ ወይም ግንኙነት የመፍጠር አጋጣሚን (probability) ሊቀንሰው ይችላል። እላይ እንደተጠቀሰው ፣ አንዱ የሌላውን ወቅታዊ የኤችአይቪ ሁኔታ ማወቁ ወይም መገንዘቡ አስፈላጊ ነው። አንድ ሰው ፣ ከቫይረሱ ጋር ግንኙነት እስከልፈጸመ ድረስ ፣ ኤችአይቪ + አይሆንም ፣ በዚህም ምክንያት ፣ ብዙ (approaches) መንገዶች (ሃይማኖታዊ ፣ ቤተሰባዊ ፣ ባህላዊ/ልምዳዊ) ከሩካቤ ስጋ መታቀብ ወይም ይኸው የሚጀመርበት ጊዜ ማራዘም ላይ ያተኩራሉ። 85% ገደማ የሚሆነው የኤችአይቪ በሽታ ፣ በወሲብ ግንኙነት ሳቢያ የሚከሰት መሆኑን አእምሮአችን ውስጥ መያዝ ያሻል። ከዚህ በታች የሰፈሩት የመተላለፊያ መንገዶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው ፣ ይሁንና ፣ ይኸኛው (እላይ የተጠቀሰው) እጅግ አንገብጋቢ ነው።

2) የደም ከደም ጋር ንኪኪ ማድረግ ወይም ግንኙነት መፍጠር  
ይህ ኤችአይቪ ከተሸከመው የአንድ ሰው ደም ፣ ኤችአይቪ ካልተሸከመው ሰው ደም ጋር ሲቀላቀል ወይም ሲገናኝ ማለት ነው። በዚህ ግንኙነት ምክንያት ፣ ቫይረሱን ተሸከሞት ያልነበረ ሰው ፣ ኤችአይቪ + ይሆናል። ይህ በአያሌ ሁኔታዎች ሊያጋጥም ይችላል። ለምሳሌ ፣ መርፌ በመጠቀም ወይም በመዋሰን ፣ የአንድ ሰው ደም ፣ በጣም ትንሽም ቢሆን ፣ ወደ ሌላው ሰው ፣ በመውጋት ለመተላለፍ ይችላል። በዚህም ምክንያት ፣ ማንኛውንም መርፌ በአግባቡ ከተውሳክ ወይም ከሆሰ ንጹህ ማድረግ ወይም ማምከን (sterilise) ያስፈልጋል። (የማምከኛ መሳሪያዎች በማይገኙበት ወቅት ፣ ዕቃዎችን በክሎሮክሰ ኬሚካል ማጽዳት ወይም ለሰላሳ ደቂቃዎች ማፍለት ይቻላል።) እንደዚህ ዓይነት መተላለፍ ሊያጋጥሙ የሚችሉበት ፣ ሌሎች ሁኔታዎችን ማሰብ እንችላለን ፡- የጸጉር ማስተካከያ/መላጫ ፣ የወ/ቅራት ወይም ንቅስት (tattoo) መሳሪያዎች ፣ የመውጊያ ሰለታም መሳሪያዎች ፣ የተባይ መልቀሚያ መሳሪያዎች (ወረንጦ) ወዘተ። ከነዚህ ዋና ዋና የማስተላለፊያ መንገዶች ጋር የሚያያዙ ወይም የሚዛመዱ የማሰራጫ መስመሮች አንዱ የደም ማስተላለፍ ወይም ዝውውር ነው። ይኸው ደም ያልተመረመረ የሆነ እንደሆነ ፣ ቫይረሱን የተሸከመው ደም ወደ ሰውነት ሊገባ ይችላል። በአሁኑ ወቅት ፣ ይኸው የማስተላለፊያ መንገድ የተዘወተረ (common) አይደለም እንጂ ፣ ከሐያ ዓመታት በፊት ማለት ፣ በአሜሪካ አቢይ ችግር ነበር።

3) ከእናት ወደ ልጅ ማስተላለፍ  
ኤችአይቪ ያላቸው ሴቶች ፣ ቫይረሱን ወደ ሕጻናቸው ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ይህ በእርግዝና ወቅት ፣ በወሊድ ጊዜና በጡት ማጥቢያ ጊዜ የሚከሰት ነው። የሕክምና አገልግሎትን መጠቀም ፣ የዚህን የመከሰት ሁኔታን ሊቀንሰው ይችላል ፣ በብዙ ቦታዎች ይኸንኑ አገልግሎት ካለክፍያ በነጻ ይሰጣል። ይኸው ጥንቃቄ እንዲወሰድ ግን ፣ እናት የዋ ፣ የኤችአይቪ ወቅታዊ ሁኔታዎች ማወቅ አለባት። አንድ ኤችአይቪ ያልተሸከመች ሴት ፣ ቫይረሱን ወደ ልጅዋ አታስተላልፍም። አንድ ኤችአይቪ የተሸከመች ሴት ፣ ቫይረሱን ወደ ልጅዋ የማስተላለፍ ዕድል 35% ገደማ ነው። [ይህ አጋጣሚ (probability) ነው።]

85% የዚህ ቫይረስ መተላለፍ የሚከሰተው ፣ በወሲብ መሆኑን እናስታውሰን። ሌሎች የመተላለፊያ መንገዶችንም ቢሆን ልናስተውላቸው ይገባል ፣ ይሁንና ፣ የጉዳቱን ከፍተኛነት ግምት ውስጥ በማስገባት ፣ ትኩረቱ በመጀመርያው መንገድ ላይ እንዲያርፍ ያስፈልጋል።

ክለሳ

- በአብዛኛው የተለመደ በኤችአይቪ የምንጠቃበት መንገድ ምንድን ነው?
- ይኸንኑ የመተላለፊያ መንገድን ለመቀነስ ወይም ለመከላከል አንዳንድ ዘዴዎች አሉን?
- የደም ከደም ጋር ንኪኪ ወይም ግንኙነት ምንድን ነው?
- ይኸንኑ የማስተላለፊያ መንገድን ለመቀነስ ወይም ለመከላከል አንዳንድ ዘዴዎች አሉን?
- ከእናት ወደ ልጅ ማስተላለፍ ምንድን ነው?
- ይኸንኑ የማስተላለፊያ መንገድን ለመቀነስ ወይም ለመከላከል አንዳንድ ዘዴዎች አሉን?
- ሰብቱን መንገዶች የምንከላከለበት ቁልፍ ዘዴ ምንድን ነው?
- ለምንድን ነው በወሲባዊ ግንኙነት በሽታ የማስተላለፊያ መንገድ ላይ የምናተኩረው?

ጤንነታችንና አመጋገባችን ፣ ሰውነታችን ራሱን እንዲጠግንና ፣ ራሱን በተለይ ከበሽታዎች/ነቀርሳዎች እንዲከላከል ፣ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። አንድ ሰው ፣ ከኤችአይቪ ጋር አንዴ ግንኙነት በማድረግ ፣ ኤችአይቪ+ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ፣ በአንዳች ወሲባዊ ግንኙነት ብቻ ፣ ኤችአይቪ+ ሆነዋል ፣ ሌሎች ለኤችአይቪ የተጋለጡ ቢኖሩም ፣ ኤችአይቪ+ ግን አልሆኑም። አንዳንድ ሰዎች ፣ ይህ ከጤንነት ጋር የተያያዘ ነው ብለው ያምናሉ። አንድ ሰው ፣ ጤንኛ የሆነ እንደሆነ ፣ በሽታውን/ነቀርሳውን ለማቆም የተሻለ ዕድል አለው። አንድ ጤንኛ ሰው ፣ የኤችአይቪ ነቀርሳን ለማቆም ፣ ከበሽተኛው ሰው የተሻለ ዕድል አለው ተብሎ ይታሰባል። እንደ የሳምባ በሽታ (ቲቢ) እና የወባ በሽታ በመሳሰሉት ሌሎች በሽታዎችም ቢሆን ይኸው ሁኔታ ተመሳሳይ ነው።

ሰውነታችን አራት ዋና ዋና የምግብ ክፍሎች አሉት። አንደኛ ፡- ፕሮቲን (በስጋ ፣ ወተት ፣ እንቁላል ፣ ምስርና በባቄላ የሚገኝ) ጡንቻዎቻችንን ለማንጸና በሽታን የሚከላከል ተፈጥሮአዊ ዓቅማችንን ይረዳሉ። ፕሮቲን መመገብ ብቻ ግን በሽታን የመከላከል ዓቅምን የላቀ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደርገዋል ማለት አይደለም ፣

ጤና ለመሆን እነዚህ ኣራት የምግብ ክፍሎች ያስፈልጋሉ። ሁለተኛ ፡- ቅባቶች (የዘይት ዓይነቶች ፣ የሰጋ ዓይነቶች ፣ ኣትክልትና ክሌሎችም) ሓይል ለማክማቸትና ሰውነታችንን (ክብሽታ) ለመጠበቅ ይረዳል። ሰዎች ፡- ካርቦሃይድሬት (በእህል ዓይነቶች ፣ በዳቦ ዓይነቶች ፣ በሰኳር ፣ በፍራፍሬዎች ወዘተ የሚገኝ) ሰውነታችንን ጉልበት ይሰጣል። በስተመጨረሻ ፡ ሰውነታችንን ጎዶሕ ወሃ ያስፈልገዋል።

የኣንድ ሰው ጤንነት ፣ ከንጽሕና ከጽዳት ኣጠባበቅ ፣ (hygiene and sanitation) ጋር የተሳሰረ ወይም የተቆራኘ ነው። ሰውነታችንን በንጽሕና መጠበቅ ፣ በተከታታይ ወይም በየጊዜው መታጠብና የቆሰለውን ወይም የተጎዳውን ኣካል በተገቢው መንገድ መያዝ እጅግ ኣስፈላጊ ነው። እላይ እንደተጠቀሰው ፣ ኤችኣይቪ/ ኤይድስ ሰውነታችንን ያዳክመውና ሌሎች በሽታዎች ፣ ሰውነታችንን እንዲጎዱት ነጻ ይለቃቸዋል። ኤችኣይቪ ፣ የሰውነታችን የመከላከልና የመጠገን ዓቅምን ስለሚያዳክም ወይም ስለሚያመናምን ፣ ለሁሉም ዓይነት በሽታዎች የሕክምና ዕርዳታ መሻት ወይም ማፈለግ ኣስፈላጊ ነው።

ለምንድርነው በኤችኣይቪ የመለከፍ ብዛት እየጨመረ ያለው? ማሕበራዊ ምክንያቶች (በኣጭሩ)

ከእውነታ መሸሽ ወይም እውነታን ማስተባበል (denial) ፡- “የሱ ዓይነት ነገር እኔን ኣያገኘኝም” የሚሉና እነዚህን የመሳሰሉት ኣስተሳሰቦች ፣ ኤችኣይቪ/ኤይድስ እውነትም ችግር መሆኑ መከድን የሚያመለክት ነው።

ጾታ ፡- ጾታዊ በደል (abuse) ፣ ሴትን ዝቅ ኣድርጎ መመልከት ፣ ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ እኩልነት ኣለመኖር እንዲሁም ባዮሎጂካዊ ምክንያቶች

ትምህርት ፣ የጾጋዎች ወሰንነት ፣ የተሳሳተ/የተዛባ ግንዛቤ ፣ የማስተማርን ሒደት መገታትና እንዲሁም በብሽታው መያዝ እንደ የውርደት ምልክት መቁጠር ወይም ማየት (stigma)

የብዙሐን መገናኛ ፡- የወሲብ ግለባላዊነት ፣ ይህም ማለት ፣ ጾታዊነት (sexuality) በብዙሐን መገናኛ እና በወሲባዊ ቱሪዝም (የወሲብን ፍላጎት ለማርካት ፣ ወደ ተለያዩ ኣገሮች መንሸራሸር ወይም ጉዞ ማድረግ) በኣመዛኙ በቴሌቪዥን ወይም በሌሎች የብዙሐን መገናኛ ማስታወቂያ የሚሰራጩበት ወይም ደግሞ ከፍ ከፍ የሚደረግበት ነው። እነዚህ የመገናኛ ቦሮች ፣ ኣብዛኛውን ጊዜ ፣ እንደ ኤችኣይቪ በመሳሰሉት ፣ የኣባል ዘር በሽታዎችን ወይም መከላከያዎቻቸውን ኣስመልክተው ኣይናገሩም።

የሕክምና ኣገልግሎት ፡- ውድ መሆን (ዋጋ) ፣ ዕጦት ፣ ሊደረስ ወይም ሊገኝ የማይችል መሆን ፣ በሽታውን እንደ የውርደት ምልክት ኣድርጎ መመልከት ፣ የሕክምና ኣገልግሎት የሚሰጥበት ሰዓታት የተወሰነ መሆን (ከበሽተኛው ሁኔታ ጋር ሲታይ) ፣ ከበሽታ መከላከያው ዘንድ ሊደረስ የሚችል ኣለመሆንና የኣባል ዘር በሽታዎችን የሕክምና ኣገልግሎት ዕጦት (ወጪዎችና የበሽታው እንደ የውርደት ምልክት ኣድርጎ መመልከት)

ባህል ፡- እኩልነት ባለመኖሩ ምክንያት ፣ ስለ ወሲብ ለመነጋገር ወይም በጥንቃቄ ወሲብ መፈጸምን ኣስመልክቶ ለመደራደር ኣለመቻል

ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ፡- የተመጣጠነ ምግብ ዕጥረት (malnutrition) ፣ ለጤና ጥበቃ የሚደረጉ ወጪዎች ፣ የኣንጥንጥር ዘይቤ (lifestyle) ፣ ለሕክምና ክትትል የሚውል ወጪ

የኣባል-ዘር በሽታዎች (STDs) ፡- እነዚህ በሽታዎች በኤችኣይቪ ለመለከፍ የጋራ ጠንቅ (co-factor) የሚሆኑ ናቸው። (የማስተላለፍ ኣጋጣሚ (probability) እንዲጨምር የሚያደርጉ ናቸው።)

ጦርነት ፡- ጾታዊ በደል ፣ ሕዝባዊ ንቅናቄ (ዓማጽያን/የሽምቅ ተዋጊዎች ፣ ሰራዊት ፣ ሰደተኞች)

ኤችኣይቪ/ኤይድስ በዓለም-ኣቀፍ እይታ

ዩኤን ኤይድስ (ሪፖርት ታህሳስ 2005 እ.ኤ.አ.) 40 ሚሊዮን ሰዎች በኤችኣይቪ/ኤይድስ እንደተያዙ ይገምታል። እስከ ዛሬ ድረስ ፣ 25 ሚሊዮን የሚገመቱ ሰዎች ሕይወታቸውን ኣጥተዋል። በኤችኣይቪ ከተያዙት 90% የሚሆኑት ሰዎች ፣ በበሽታው መያዛቸውን እንደሚያውቁትና ፣ ከነዚህም ኣብዛኞቹ ገና በማደግ ላይ በሚገኙት ኣገሮች ዘንድ እንደሚኖሩ ይገመታል። ወጣቶችና ጎረቤቶች ለበሽታው እጅግ የተጋለጡ ናቸው (ይሁንና ፣ በማንኛውም የዕድሜ ክልል የሚገኝ ሰውም ቢሆን በበሽታው ሊጠቃ ይችላል) ። በ2005 እ.ኤ.አ. ከ50% በላይ የሚሆኑት ፣ በዚህ በሽታ የተያዙት ሰዎች በ15-24 ዕድሜ ክልል የነበሩ ናቸው። በየቀኑ ከ8000 ሰዎች በላይ በኤችኣይቪ/ኤይድስ ይሞታሉ ፣ እንዲሁም 14,000 ሰዎች በየቀኑ በዚህ በሽታ ይያዛሉ። ኣንዳንድ ጥናቶች ፣ በዚህ በሽታ ከተያዙት ፣ 250 የሚሆኑት (ሌሎች ጥናቶች ፣ ከዚህ ቁጥር በበለጠ ፣ እስከ 2000 የሚደርስ ቁጥር ይገምታሉ) በወሊድና በጡት ማጥቢያ ጊዜ የሚያዙት ሕጻናት መሆናቸውን ይገምታሉ። ኤችኣይቪ/ኤይድስ ፣ ወዲያውኑ (በኣጭር ጊዜ ውስጥ) በሕይወትና በሞት

ከሚያደርሰው ጉዳት በተጨማሪ ፡ ሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎችን ይጎዳል። ይኸውና 14,000,000 የሚገመቱ ልጆች ፡ ኤይድስ ባስከተለው ሞት ፡ ወላጅ-አልባ ሆነዋል። ከሞቱት ሰዎች መካከል ፡ 7,000,000 ገበሬዎች ናቸው። ይኸው ቁጥር ፡ በ2020 እ.ኤ.አ. ወደ 16,000,000 ከፍ እንደሚል ይጠበቃል። ኤይድስ ፡ አስተማሪዎችን ነክትዋል (በደቡብ አፍሪቃ ፡ ከሞቱት ሰዎች 85% ቢኤይድስ ሳቢያ ነው።) ኤይድስ ፡ በቂ መሰናዶ ወይም ዝግጅት ላለደረጉት ፡ የተምላላ ፊናንስ ወይም ገንዘብ ለሌላቸው ፡ በበሽተኞች ለተሞላቀቁት ስርዓተ-ሕክምናዎችን ነክተዋል። (80% የሚሆኑት የሆሰርታል አልጋዎች የተያዙት በኤችአይቪ/ኤይድስ በታመሙ ሰዎች ነው)

ክለሳ

አመጋገብ በሽታን በመከላከል ረገድ ምን ዓይነት ሚና ይጫወታል?  
ለምንድርነው የሕክምና ክትትል አስፈላጊ የሆነው?  
ለምንድርነው የኤችአይቪ/ኤይድስ ብዛት እየጨመረ ያለው?  
ሌሎች ምክንያቶችን ለሰጡ ወይም ሊጨምሩ ይችላሉ?  
በአገር ውስጥ እጅግ ወሳኝ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው?  
በዓለም-አቀፍ ደረጃ ያሉት ምክንያቶች በአገር ውስጥ ካሉት ጋር እንዴት ይተሳሰራሉ ወይም ይያያዛሉ?  
ኤችአይቪ/ኤይድስ ወዲያውኑ የሚያደርሳቸው ጉዳቶች ምን ምን ናቸው?  
የኤችአይቪ/ኤይድስ ይበልጥ የረዥም ጊዜ ወይም ቋሚ ጉዳት ምን ምን ናቸው?

መከላከያ

በኤችአይቪ/ኤይድስ የተያዙ ሰዎች ፡ በአንዳንድ መላዎች ወይም ዘዴዎች ሊረዱ ይችላሉ ፡-  
(1) አንቲ (ጸረ) ረትሮቫይራል የሕክምና ክትትል- ይሁንና ፡ ኤችአይቪን የሚፈውስ መድሃኒት የለም ።  
(2) ሰውነትን ከበሽታ የመከላከል ዓቅምን እንዲጠገን ማድረግ እንዲሁም  
(3) በሁለተኛ በሽታዎች (secondary infections/diseases) ላይ የሕክምና ክትትል ማድረግ

የጸረ-ረትሮቫይራል ሕክምና ፡ የሚያድን አይደለም ። ኤችአይቪ/ኤይድስን የሚያድን መድሃኒት የለም። እነዚህ የሕክምና ክትትል ፡ ሰውነትን ከበሽታ የመከላከል ተፈጥሮአዊ ዓቅምን ያግዛሉ ። እንዲሁም ፡ የኤችአይቪ/ኤይድስን ግስጋሴ ይቀንሳሉ። ይህ ሕክምና በኤችአይቪ/ኤይድስ የተያዙ ሰዎችን ሕይወት ሊያራዝም ይችላል። በሁለት ወር የሕክምና ክትትል ብቻ ፡ ዓቢይ የጤና መሻሻል የሚያስገኙ በመሆናቸው ፡ እነዚህ መድሃኒቶች ተአምራት በመሰራት ነው የሚታወቁት።

በእርግጥ የጸረ-ረትሮቫይራል ሕክምናዎች ፡ አንዳንድ አሉታዊ ጎደኞች/ገጽታዎች አልቀቸው። ዋጋቸው እጅግ ወደ ነው። ገና በማደግ ላይ በሚገኙ አገሮች ዘንድ ፡ እነዚህን ማግኘት ፡ አስቸጋሪ ነው ። ጎጂ ጎኖችም አልቀቸው። (በኤችአይቪ/ኤይድስ ከተያዙቱ አመሪካውያን ከ20-30%ቱ ፡ እነዚህን ጸረ-ረትሮቫይራል መድሃኒቶችን ፡ ለወሰዱ አልቻሉም።) እንዲሁም ፡ ቫይረሱ መድሃኒቶቹን እየመከተ በሚጨምረው ወቅት ፡ የጸረ-ረትሮቫይራል ሕክምና ወጤታማነትን ይቀንሳል።

የጸረ-ረትሮቫይራል ሕክምና ፡ እጅግ የታመመን ሰው ጤንነቱን እንዲያገኝ ወይም እንዲሻለው ሊረዱ ይችላሉ ። ፈጣሪ ግን አይደሉም። በሽታን የመከላከል ዓቅም ፡ በተምላላ ጤንነትና በተገቢው አመጋገብ ሊታገዝ ይችላል።

እናስታውስ - በኤችአይቪ/ኤይድስ መሞት ፡ ሁለተኛ (secondary) በሽታ ፡ ኤችአይቪን የመከላከል ዓቅሙ በተዳከመ ሰውነት ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት ጋር የተሳሰረ ነው። በዚህም ምክንያት ፡ በሁለተኛ ምቹ ጊዜ ጠባቂ በሽታዎች (secondary opportunistic infections) ላይ ሕክምና ማከራከር ለኤችአይቪ/ኤይድስ በሽተኞች ጤንነትና ሕይወት እጅግ አስፈላጊ ነው። በነዚህ ፡ ሁለተኛ በሽታዎች ላይ የሕክምና ክትትል ማድረግ ፡ የኤችአይቪ/ኤይድስ ሕሙማንን ሕይወት ሊያራዝም ይችላል።

ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍን መከላከል

ኤችአይቪ ተሸክመው እያሉ ፡ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ፡ ቫይረሱን ወደ ሕጻናቶቻቸው የማስተላለፍ 35% አጋጣሚ (probability) አላቸው። እላይ እንደተጠቀሰው ፡ ይኸው እንዳያጋጥም ወይም እንዳይከሰት የሚከላከል ፡ ሕክምና መውሰድ ይቻላል። ይኸንን አጋጣሚ ለመቀነስ ፡ እናቶችን በቅድመ-ወሊድና በድህረ-ወሊድ ጊዜያት ፡ አንድ ነቢራፓይን የተባለ መድሃኒት ፡ በንጽጽር ወይም በመጠኑም ቢሆን ዝቅ ባለ ወጭ (4 ያለር አሜሪካ ገደማ) ሊቀርብ ይቻላል። ይህ ሕክምና ፡ በዝቅተኛ ዋጋና በቀላሉ ስራ ላይ የሚውል በመሆኑ ይዘወተራል። አንዳንድ የመድሃኒት ኩባንያዎችም ፡ ሕክምናውን በነጻ ያቀርባሉ። አስፈላጊው ሕክምና ለማድረግ ይቻል ዘንድ ፡ የኤችአይቪ ወቅታዊ ሁኔታ (HIV status) መታወቅ ፡ እናቱቱንና ሕጻኑን ጠቃሚ ወይም ቁልፍ ነገር ነው።

ክለሳ

በኤችኤይቪ ለተያዙ ሰዎች ፣ ያሉባቸው ሰዎች አማራጮች ምን ምን ናቸው?  
 የጸረ-ረትሮቫይራል ሕክምናዎች ምንድናቸው ?  
 እነዚህ የጸረ-ረትሮቫይራል ሕክምናዎች ምንድናቸው የሚሰሩት?  
 በሽታውን ሙሉ በሙሉ የሚፈውስ ወይም የሚያድን መድሐኒት አለን?  
 አሉታዊ ገጽታዎቻቸው ምን ምን ናቸው?  
 ተጨማሪ ወይም ተደራቢ ችግሮቹ ምን ምን ናቸው?  
 ከእናት ወደ ልጅ ማስተላለፍ ማለት ምንድነው ወይም የሚተላለፈው እንዴት ነው?  
 ነቢራፓይን ምንድናቸው?  
 የኤችኤይቪ በሽታ ስርጭትን ለመከላከል ሁሉንም ሰው የሚረዳ ፣ ቁልፍ ነገር ምንድናቸው?

ጾታ

ኤችኤይቪ ፣ ብዛቱ ባለተመጣጠነ ወይም ሚዛኑ ባለጠበቀ ሁኔታ ፣ ወንዶችን ማጥቃት ጀምሮታል ፣ ይሁንና ፣ ባለፉት ቅርብ ጊዜያት ፣ ሴቶችም እያደገ በመጣው ብዛት ይበልጥ ተጠቅተዋል። በበሽታው በ2005 እ.ኤ.አ. ከተያዙት ሰዎች ከ50% በላይ የሆኑት ሴቶቹ ናቸው። ይህም ሁኔታ ፣ ከሴቶቹ የሰውነት ቅርጽ (women’s physical biology) ፣ ከሚሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ፣ ከመብቶችና ከሴቶቹ የሚሕበራዊ ደረጃ ጋር የሚተሳሰር ነው።

በወንዶች ዘንድ እንደሚታየው ሁሉ ፣ የበሽታው መተላለፍ በዋናነት የሚከሰተው ፣ በሁለት ተጻራሪ ጾታዎች በሚደረግ ወሲብ ነው። ባለፉት ቅርብ ዓመታት ፣ ኤችኤይቪ + የሆኑት ሴቶቹ ቁጥር በየዓመቱ ብዕጥፍ አድጓል። በአማካይ ፣ በየ20 ሰዓታት አንዲት ገና በማደግ ላይ ባሉት አገሮች የምትገኝ ሴት ፣ ኤችኤይቪ + ሰለባ ትሆናለች ። የሴቶች መብትና በቤተሰብ እንክብካቤ ላይ ያላቸው ሐላፊነት ፣ በተለይም አንድ የቤተሰብ አባል ኤችኤይቪ + በሚሆንበት ወቅት ፣ የሕክምና ዕርዳታ የማግኘት ዕድላቸውን ይቀንሳል። እያደገ የመጣው የሴቶች ለኤችኤይቪ + መጋለጥ ፣ ከሚከተሉት ነጥቦች ጋር ይተሳሰራል ፡-

1) ባዮሎጂ ፡- ፣ ሴቶች በግብረ-ሰጋ ግንኙነት ተቀባይ ጓደኛ (Receptive Partners) ሲሆኑ ፣ ሰውነታቸውም ከወንዶች ሰውነት የበለጠ ተቀባይ አክባቢ አለው። የወሲብ ተግባር ከሰውነታቸው አካላዊ ቁመና ጋር ተዳምሮ ፣ ለተጨማሪ አደጋ ያጋልጣቸዋል። ከዚህ ባሻገር ፣ በወሊድ ጊዜ ፣ ከእናት ወደ ሕጻን ኤችኤይቪ ለተላለፍ ወይም ለሰራጭ ይችላል።

2) ሕብረተሰብ/ባህል ፡- ሴቶች ባላቸው ዝቅተኛ የሚሕበራዊ ደረጃ ፣ የጾታ የበታች አመለካከት (Sexual subordination) ያጋጥማቸዋል ፣ ይህ አብዛኛውን ጊዜ ከባህላዊ ክብር ጋር የተሳሰረ ነው። ይህ የበታች አመለካከት በጾታዊ አስገዳጅነት (sexual coercion) እንዲሁም በጫና/በደል/በጉልበት (domination/abuse/violence) አማካይነት ሊከሰት ይችላል። ይህ በሐይል ወይም አብዛኛውን ጊዜ ሴትኛ-አዳሪነት ተብሎ በሚታወቀው ፣ በንግዳዊ የወሲብ ስራ (commercial sex work) አማካይነት ሊያጋጥም ይችላል። አንዳንድ ሴቶች ፣ በጾታዊነት (sexuality) ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ፣ ፈቃድ ወይም መብት ያላቸው አይመስላቸውም ፣ ጥንቃቄ ባለው ወሲብ (safer sex) ጉዳይ ላይ ለመደራደርም ቢሆን ዓቅም የላቸውም።

3) ኢኮኖሚያዊ ፡- ሴቶች ፣ ወደ ወሲብ ስራ (ሴትኛ-አዳሪነት) እንዲገቡ የሚገደዱበት ምክንያት ፣ ወደ አምራች ሐይል (work-force) እንዲቀላቀሉ ስለማይፈቀድላቸው ፣ ወይም በኢኮኖሚ ረገድ በፍቺ ወይም በሞት ከቤተሰብ ከሚለይዋቸው ወንዶች ዘንድ ስለሚጠጉ ፣ ወይም ደግሞ በሕብረተሰቡ ዘንድ የሰራ ዕድል (ምግብ ወይም ገንዘብ ለማግኘት የሚያስችል) ላይኖር ስለሚችል ነው። ገንዘባቸው/ማሕበራዊ ደረጃቸው/ንብረታቸው ስለሚያማልላቸው ፣ ልጃገረዶች ፣ ሹጋር ዳዲስ ‘Sugar Daddies’ (ብዕድሜ በጣም የሚያንሱባቸውን ሴቶች በመማረክ ፣ በነሱ ላይ ወሲባዊ ፍላጎታቸውን የሚያረኩ ሐብታም ወንዶችን) ያገኛቸዋል ። እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ተደማምረው ፣ በሴቶች ላይ የበታች አመለካከትን ይፈጥራሉ ፣ ከሕብረተሰብ/ባህል ጋርም ይተሳሰራሉ።

4) ኤፒደሚዮሎጂካዊ ፡- አንዳንድ ሴቶች ፣ በወሊድ ጊዜ የደም ዝውውር (blood transfusion) ወይም የደም መተኪያ ያስፈልጋቸዋል ፣ በዚህም ምክንያት ፣ እነዚህ ሴቶች ከወንዶች ይበልጥ ለተጨማሪ መተላለፍያ መስመር የተጋለጡ ናቸው ።